CARABIDAE (Scaritini)

VON

M. BÄNNINGER (Giessen)

Menigius hintzi major BÄNNINGER n. sbsp. [1].

In der Bestimmungstabelle (*Ent. Blätter*, 1929, p. 87) kommt man mit gewissen Einschränkungen, die aus Nachstehendem hervorgehen, auf *hintzi*, zu dem die neue Form als Rasse zu stellen ist. Während die Paragenae auf der linken Seite beim ♂ am Ende der verlängerten Maxillarspalte flach von vorn gesehen ein scharfes Zähnchen bilden, fehlt diese Auszeichnung bei *major*; dafür befindet sich beiderseits hinten in der äussern Hälfte eine nach aussen gebogene Falte. Halsschild stärker quer, der Basalteil hinter den Hinterecken viel regelmässiger, fast regelmässig gerundet oder etwas geradlinig nach hinten verengt, ohne Ausschweifung jederseits vom Mesothorakalstiel, welche bei der Prioritätsform die Basis etwas halsförmig vorgezogen erscheinen lässt. Basis der Decken zwischen den groben Tuberkeln viel weniger granuliert; auch die schmälere Series umbilicata mit viel schwächerer Granulierung; der 8. Zwischenraum bleibt fast vollkommen frei oder sie ist nur sehr fein und unscheinbar. Der 8. Streifen ist dadurch schärfer ausgeprägt. Microskulptur der Decken in beiden Geschlechtern tiefer, die Oberseits dadurch etwas matter. Grösser als die Prioritäsform. Länge 17 ½-19 mm, statt 14-16 ½ mm.

Material : 2 ♂ 2 ♀ Kamatembe 2.100 m (Typen); 2 ♀ Forêt Nyasheke 1.820 m, Nyamuragira. Bei den beiden letzteren ist die regelmässige Rundung der Halsschildbasis noch etwas stärker ausgeprägt. Nach meinen Notizen gehört auch ein Stück (20 mm) aus Uganda, Western Ankole, 4500-5000′, das mir vor einigen Jahren aus dem Britischen Museum vorlag, hierher.

Die Halsschildform und die schmälere, schwach granulierte Series umbilicata bilden einen Uebergang zu *burgeoni* und *rotundicollis*. Die Neigung zur schwächeren Ansbildung der Ventralstrigae und vor allem der gegen das Ende gleichmässig verengte Penis, welche *hintzi* in Gegensatz zu diesen beiden Arten sowie *schaumi* und *camerunensis* bringen, finden sich auch bei *major*.

---

[1] Mein 24. Beitrag zur Kenntnis der *Carabinae*.

1. — Diatypus Smithi *Murr.*

2. — Diatypus ruwenzoricus *Burg.*

3. — Hyparpalus diastictus *All.* Nindae *ssp. n.*

4. — Agonum (Megalonychus) Nindae *n. sp.*

5. — Chlaenius Wittei *n. sp.*

6. — Agonum (Megalonychus) mokoto *n. sp.*

7. — Chlaenius (Oochlaenius) kivuensis *All.*

8. — Thyreopterus bilunatus *Burg.*



9. Drypta dealata *n. sp.*